

Ce modèle d'imprimé comporte des colonnes pour quatre patients, mais en pratique il y en aurait beaucoup plus

Numéro du patient		1	2	3	4	
Initiales de l'enquêteur						
Numéro de fiche du patient						
Diagnostic						
Age						
Sexe						
Poids						
Date du traitement						
Critères (indicateurs)						
<b>Justification de la prescription</b>	Seuil	Oui/Non	Oui/Non	Oui/Non	Oui/Non	Moyenne
1. Infections graves dues à des souches sensibles de bactéries aérobies Gram-négatif résistantes à la gentamicine et à la tobramycine						
2. Suspensions d'infections graves contractées à l'hôpital avec des taux élevés de résistance à la gentamicine et à la tobramycine						
3. En association avec une pénicilline anti-pseudomonas lors du traitement d'infections graves à Pseudomonas						
<b>Indicateurs de processus</b>		Oui/Non	Oui/Non	Oui/Non	Oui/Non	Moyenne
4. Doser la créatinine sérique avant le traitement ou dans les 24 heures après le début du traitement						
5. Dose de charge de 7,5 mg/kg (IV ou IM) par rapport au poids corporel idéal						
6. Dose d'entretien de l'ordre de 15 mg/kg par jour par rapport au poids idéal (exception : insuffisance rénale)						
7. Passage à un traitement par la tobramycine, la gentamicine ou un autre médicament si la culture/l'antibiogramme indique un médicament moins cher ou plus approprié						
<b>Indicateurs de résultat</b>		Oui/Non	Oui/Non	Oui/Non	Oui/Non	Moyenne
8. Amélioration clinique notée dans le dossier du patient						
9. Fièvre retombée à la normale dans les 72 heures						

Holloway K., Green T., *Les comités pharmaceutiques et thérapeutiques : guide pratique, OMS et MSH 2005.*