

MESURES MISES EN PLACE SUR L'USAGE
RATIONNEL DES MÉDICAMENTS
ANTIRÉTROVIRAUX ET ANTICANCÉREUX
À L'HÔPITAL DU POINT G (MALI)

Introduction

- L'usage rationnel des Médicament est définit comme étant le principe par lequel il faut:

«Prescrire le produit le plus approprié, obtenu à temps et moyennant un prix abordable pour tous, délivré correctement et administré selon la posologie appropriée et pendant un laps de temps approprié.» (OMS, 1985).

- Au CHU du Point G ce principe est appliqué pour le traitement des patients atteints de cancer ou vivant avec le VIH/SIDA

Principales mesures

- Gratuité des médicaments anticancéreux et des ARV pour tous les patients
- Protocole de prescription élaboré avec des schémas standards de prise en charge
- Prescriptions nominatives et individuelles pour tout patient
- Dispensation nominative et individuelle dans le service de Pharmacie
- Prescripteurs et services de prescription désignés et limités
- Dispensation exclusivement exécutée par un pharmacien

ARV Dispositions particulières

- Une procédure d'inclusion devant favoriser l'observance au traitement
- Nombre de mois de traitement limité à 1mois
- Instauration d'un système de retour à la pharmacie des médicaments non utilisés
- Animation de séances d'Education Thérapeutique

ARV Quelques Difficultés

- Nous rapportons les principaux résultats d'une étude portant sur l'évaluation de l'observance au traitement des patients sous ARV.
- Déterminer le taux d'observance thérapeutique aux ARV.
- Il s'agissait d'une étude descriptive transversale d'octobre à décembre 2015 au CHU du Point G

ARV - Résultats

- Sur le logiciel de suivi des patients **94,1%** étaient inobservants au traitement.
- Ce taux était de **63,4%** selon l'affirmation des patients
- Pour le retour du reste de médicament
 - **14,3%** des patients ont réellement apporté le reste des comprimés à la pharmacie.
 - **85,7%** des patients affirme avoir le reste des médicaments à la maison

Anticancéreux - Quelques Difficultés

- Nous rapportons les principaux résultats d'une étude portant sur l'évaluation de la pratique de dispensation et d'administration des médicament anticancéreux au CHU du Point G.
- Il s'agissait d'une étude Prospective descriptive
- Etude menée en octobre 2016

Anticancéreux - Résultats

Schémas les plus prescrits

Schémas	Fréquence %
Folfox	35,00%
AC-60	15,00%
ABVD-J15C5	5,00%
Adria/Bleo/Oncovin	5,00%
BleoJ15	5,00%
Doxorubicine	5,00%
Folfiri	5,00%
Taxol/CarboAUC5	5,00%
Taxotere/Zometa	5,00%
Taxoterre	5,00%
Vinorelbine	5,00%
Zometa	5,00%


Anticancéreux - Résultats

Les médicaments les plus prescrits pour la chimiothérapie étaient au nombre de huit :

- Acide Folinique
- 5FU (5 Fluoro Uracile)
- Oxalplatine
- Doxorubicine
- Paclitaxel
- Cyclophosphamide
- Carboplatine
- Dacarbazine


Anticancéreux - Résultats

% des quantités perdues des médicaments administrés par rapport aux médicaments dispensés



Anticancéreux - Résultats

Non conformité de la quantité prescrite par rapport à la quantité administrée



Anticancéreux - Résultats

Nous avons enregistré 10,81% sous-dosage à l'administration et 2,70% surdosage à l'administration par rapport à la quantité prescrite.

Recommandations

- Informer les patients de rapporter le reste des médicaments au RDV pour un meilleur suivi du traitement
- Améliorer et renforcer l'éducation thérapeutique et le suivi psychosocial des patients sous traitement ARV.
- Confier la préparation des médicaments anticancéreux à la pharmacie
- Renforcer la collaboration inter disciplinaire entre les différents acteurs de la prise en charge des patients.

Merci de votre Attention