




## ANNEXE 2. METHODE DE RINÇAGE CHIRURGICAL

Ne s'applique qu'aux extravasations périphériques. Si DAVI contacter la chirurgie viscérale  
Appeler le chirurgien plasticien dans les 6 h, pour évaluer l'utilité d'un rinçage chirurgical.

PHASE 1: Piqûres de la zone extravasée	PHASE 2: Rinçage de la zone extravasée
<p><b>Il s'agit de percer la peau de la zone atteinte (forme de pomme d'arrosoir) avec une aiguille.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Mettre une blouse de protection, des lunettes, se désinfecter les mains et enfiler 2 nouvelles paires de gants stériles.</li> <li>◆ Désinfecter la zone extravasée avec de la chlorhexidine aqueuse 0,5%.</li> <li>◆ Effectuer des piqûres perpendiculaires à la peau et espacées de 0,5 à 1 cm d'intervalle selon l'étendue de la zone atteinte (cf figures 1 et 3) :</li> <li>◆ si <math>\leq 4</math> cm de <math>\varnothing</math>, utiliser : → une aiguille violette (24G: 0,55x25mm)</li> <li>◆ si <math>&gt; 4</math> cm de <math>\varnothing</math>, utiliser : → pour les adultes <math>\approx \geq 16</math> ans ; une aiguille rose ( 18G: 1,20x40mm) → pour les enfants <math>\approx &lt; 16</math> ans; une aiguille violette (24G: 0,55x25mm)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Piquer en périphérie (au minimum à 1 cm de la zone périphérique aux 4 points cardinaux) en sous-cutané tangentielle (en oblique <math>\approx 30</math> degrés) à la peau jusqu'à la zone atteinte (cf figures 2 et 3). Selon l'étendue de la zone atteinte utiliser : → si <math>\leq 4</math> cm de <math>\varnothing</math>, utiliser une aiguille violette (24G: 0,55x25mm) → si <math>&gt; 4</math> cm de <math>\varnothing</math>, utiliser une aiguille verte (21G: 0,80x40mm)</li> <li>◆ Infiltrer 20 à 200 ml de NaCl 0,9% en fonction de la localisation. Pour que le rinçage soit efficace, le NaCl 0,9% doit s'écouler par les points de piqûres effectués en phase 1.</li> </ul> <p><b>Figure 2 : Rinçage de la zone périphérique aux 4 points Cardinaux</b></p>
<p><b>Figure 1 : localisation des piqûres à effectuer lors de la phase 1</b></p> 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center; color: red;"><b>Ponction évacuatrice = Points de piqûres</b></p>  </div> <p><b>Figure 2 : Rinçage de la zone périphérique aux 4 points Cardinaux</b></p>  <p><b>X</b> : site d'entrée  <b>—</b> : piquer à au moins 1 cm de la zone atteinte  <b>---</b> : Piquer en sous-cutané jusqu'à la zone atteinte.</p>